



Checkliste: Notfallplan

Bei einem Not- oder Krankheitsfall kann schnelles Handeln zur besseren Genesung beitragen. Lassen Sie die wertvolle Zeit nicht verstreichen, sondern bereiten Sie schon einmal alles für das Eintreffen des Tierarztes vor.



PROBLEME BEI DER GEBURT: RUHIG BLEIBEN UND SCHNELL HANDELN

Wichtige Informationen für den Tierarzt: handelt es sich um eine Kuh oder eine Kalbin, ein schweres Kalb oder Zwillinge, eine Gebärmutterverdrehung

Platz schaffen: Kuh separieren, Nachbartiere ggf. umhängen

Europaletten bereithalten: Kuh und Tierarzt sind dann auf gleicher Höhe. Die Paletten sorgen für sicheren Stand des Arztes.

Eimer mit warmem Wasser für das Waschen von Kuh und Armen bereitstellen.

Eimer mit kaltem Wasser bereitstellen, um die Atmung des Kalbs anzuregen.

Funktionstüchtiger Geburtshelfer mit Stricken: Kälberstricke eignen sich besonders gut, wenn das Kalb tief in der Bauchhöhle liegt.

Bei einem Kaiserschnitt werden benötigt:

- Tisch und Handtücher oder Bettlaken
- warmes Wasser und Seife für die Kuhrasur
- Platz auf der linken Seite (Eingriffseite): Nachbarkühe weghängen
- kalbende Kuh mit Halfter fixieren und Schwanz am Hinterbein festbinden

Helfer: Mindestens zwei Personen holen das Kalb aus der Bauchhöhle, ein dritter hindert die Kuh vor dem Abliegen.

GEBÄRMUTTERVORFALL: HIER IST EILE GEFRAGT

Platz schaffen: Nachbartiere wegsperren bzw. umhängen, sie dürfen nicht auf die Gebärmutter treten

Ausgrätschen durch Schlagfessel verhindern

Hilfsmittel:

- glattes Brett (40x80cm),
- große Laken/Handtücher,
- leere und saubere Flasche
- Eimer mit kaltem Wasser oder Wasserschlauch
- evtl. kleiner Tisch zum Ablegen der Instrumente

ausreichend Helfer (zwei bis drei)

PANSENBLÄHUNG: ALARMSTUFE ROT!

Mögliche Ursachen schon am Telefon ansprechen: z.B. Weideauftrieb oder Schlundverstopfung durch Rübenstücke/Äpfel/Kartoffeln

Tier an geeigneter Stelle fixieren

bei Blähung mit schaumiger Durchmischung des Panseninhalts: Gas brechende Substanzen durch Schlundsonde einführen



bei Blähung mit oben gelegener Gasblase: Gartenschlauch (2,2 – 2,5 m) über Speiseröhre in den Pansen vorschieben bis das Gas entweicht

Pansenstich (bei beiden Krankheitsbildern): Messer muss sauber und desinfiziert sein, 10 – 15 cm langer Schnitt an linker Flanke (Hungergrube), schaumiger Futterbrei läuft ab bzw. Gas entweicht

Wunde anschließend vom Tierarzt antibiotisch abdecken lassen

ZITZENVERLETZUNG

Art der Verletzung am Telefon schildern (z.B. Riss)

Tier fixieren

Reinigung des Wundbereichs mit sauberem Wasser

gute Beleuchtung gewährleisten

MASTITIS

Fieber messen

Arzt über Art der Mastitis informieren

Milchproben vor dem Versiegeln nehmen! Ist die Eutertube erst injiziert, kann eine Erregerbestimmung nicht mehr stattfinden

ALLGEMEINE VERLETZUNGEN

Verletztes Tier gut fixieren

Von der Gruppe isolieren bzw. Platz schaffen

Blutverlust durch Druckverband mindern, Blutung nicht unterschätzen!

Verschmutzte Verletzungen mit kaltem, sauberem Wasser reinigen

Bei abgebrochenem Horn Tier im Fressgitter einsperren

Bei Pfählungsverletzungen den Gegenstand nicht herausziehen, er dichtet die Wunde ab.